



Bandol, Carqueiranne, Carry-le-Rouet, Cassis, Ceyreste, Châteauneuf-les-Martigues, Ensûès-la-Redonne, Gignac-la-Nerthe, La Ciotat, La Crau, La Farlède, La Garde, La Penne-sur-Huveaune, La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var, Le Pradet, Le Rove, Les Pennes-Mirabeau, Marignane, Marseille-Sud, Martigues, Ollioules, Port-de-Bouc, Saint-Cyr-sur-Mer, Saint-Mandrier-sur-Mer, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Victoret, Sanary-sur-Mer, Sausset-les-Pins, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Solliès-Ville, Toulon

# ...> Chaînon littoraux

## Bouches-du-Rhône, Var



FICHE  
43

Photographie : C. Tallandier, Camargue

### Massif des Calanques




(> Source 3)



### L'espace forestier à dire d'acteurs

- Forêt privée très représentée et très morcelée.
- Très faible production de bois ayant principalement pour cause les nombreux incendies qui parcourent régulièrement cet espace forestier.
- Conditions d'exploitation et d'accessibilité moyennes à difficiles (urbanisation) tant en forêt publique qu'en forêt privée.
- Rôle social très important notamment pour les loisirs de proximité et le tourisme. Faible activité cynégétique. Aspect paysager essentiel.
- Rôle environnemental principalement axé sur le maintien des sols et la biodiversité (zones côtières).
- Très fort risque d'incendie. Bon niveau d'équipement en pistes. Fort besoin de création de débroussaillage. Entretien des pistes et des débroussaillages existants à renforcer. Protection prioritaire des peuplements forestiers constitués encore intacts. Traitement nécessaire des zones d'interface.
- Très forte pression foncière. Déprise agricole ayant atteint son maximum.
- Etat phytosanitaire moyen. Risque lié à la pollution atmosphérique marqué.



### Occupation du sol et espaces boisés

#### Types d'espaces

#### → Espaces boisés

- Forêts de conifères
- Forêts de feuillus
- Forêts mélangées
- Présence d'habitat résidentiel

#### → Autres espaces

- Territoires artificialisés
- Territoires agricoles
- Milieux semi-naturels
- Maquis/Garrigues
- Roches nues
- Zones humides
- Surfaces en eau

- Limites communales
- Limites des espaces forestiers
- Communes principales



Observatoire de la forêt méditerranéenne  
ofme@ofme.org  
www.ofme.org

Les espaces forestiers en Provence-Alpes-Côte d'Azur [2003]

Région




Provence-Alpes-Côte d'Azur



La propriété forestière


→ Répartition par catégorie de propriété :



→ Structures de regroupement de propriétaires privés : ASL Boisement des Friches Agricoles, ASL Côte Bleue, ASL Sud Sainte-Baume.

(> Source 4)

→ Morcellement de la propriété privée :




Les ressources forestières

→ Descriptif des peuplements forestiers :

Surface par essence [ha]	Surface par structure (ha)						Total par essence
	Futaie régulière	Futaie irrégulière	Mélange futaie feuillue/taillis	Mélange futaie résineuse/taillis	Taillis simple	Déboisée (> 20 ares)	
• Pin d'Alep	10 010	420	-	1 970	-	150	12 550
• Autres	1 510	80	50	130	1 410	40	3 220
<b>Total par structure</b>	<b>11 520</b>	<b>500</b>	<b>50</b>	<b>2 100</b>	<b>1 410</b>	<b>190</b>	<b>15 770</b>
% par structure	73,05 %	3,17 %	0,32 %	13,32 %	8,94 %	1,20 %	100 %


• Répartition de la surface par essence :




• Volume et production :

Essences	Volume de l'essence quand elle est prépondérante (m³)	Production (m³/ha/an)
• Pin d'Alep	542 900	2,2

• Répartition du volume par essence :




→ Qualité des bois sur pied :




(> Source 1, ces données concernent uniquement les formations boisées de production)

• Répartition du volume par groupe d'essence :



→ Exploitabilité du bois :



Les risques

→ Le risque incendie :

[Période 1973-1999]



→ Surface incendiée :

Moyenne annuelle : 429 ha/an.

→ Répartition saisonnière des incendies :

- Été
- Hiver

9 PIDAF couvrent 50 % des forêts.

(> Source 7)

Aucun Plan de prévention prescrit.

(> Source 8)

• Evaluation du risque incendie :



→ Restauration des terrains en montagne (RTM) :

Aucune commune ne contient des séries RTM ou de statut équivalent. (> Source 9)

→ Risque phytosanitaire :

- Noyer hybride : Crown gall.
- Pin d'Alep : Maladie chancreuse, Scolytes.
- Feuillus div. (cormier, chêne kermès, arbousier) : Embruns.
- If : Dépérissement. (> Source 10)



Activités économiques

→ Entreprises de la forêt :

- 11 exploitants forestiers.
- 8 entreprises de la 1<sup>ère</sup> transformation.
- 44 entreprises de la 2<sup>ème</sup> transformation.

(> Source 15)

→ Autres produits forestiers :

- Indéterminés.



Interfaces

→ L'habitat en forêt :

- Habitat résidentiel en forêt : 910 ha. Moyenne régionale par espace forestier : 537 ha. (> Source 2)

→ Evolution de la SAU :

- 1970 : 12 660 ha.
- 1979 : 8 860 ha.
- 1988 : 6 730 ha.
- 2000 : 5 660 ha.

(> Source 11)

→ Surface de forêt par habitant :

- 0,03 ha/hab. pour l'espace forestier, 0,28 ha/hab. pour la région. (> Sources 1 et 12)

→ Activité sylvopastorale :

- Les unités pastorales référencées couvrent 1 % des zones forestières.

(> Source 13)



Espaces naturels remarquables

→ Parc national : Aucun.

→ Parc naturel régional : Aucun.

→ Les ZNIEFF couvrent 40 % des forêts.

→ Natura 2000 couvre 28 % des forêts.

(> Source 14)



Autres pratiques ou fonctions signalées

Echelle de valeurs :

"Non significatif", "Très faible", "Faible", "Moyenne", "Forte", "Très forte".

→ Loisirs de proximité (promenade...) : Forte.

→ Activités touristiques : Forte.

→ Paysage : Très forte.

→ Activité cynégétique : Faible.

(> Source 16)

