

Clef des gestions recommandées pour le Sapin pectiné

☪ fiche n°272110 « Clef des types de peuplements du Sapin pectiné »



Gestion recommandée

SRGS - PACA

N° 272109

- Commercialisation des bois impossible du fait de conditions topographiques défavorables ou du manque d'accès

Non intervention

- Commercialisation des bois possible

- Souvent localisé entre 1100 à 1700 mètres d'altitude (Étage Montagnard moyen et supérieur)
- Généralement en Ubac
- Substrat assurant un bon enracinement

n°272111
FUTAIE SUR STATIONS FAVORABLES
Classes de fertilité I et II
Hauteur dominante supérieure à 18 mètres à 60 ans

Peuplement irrégulier

Traitement irrégulier pied à pied, par bouquets ou par parquets comprenant :

- Le dépressage énergique des zones de semis
- Des éclaircies énergiques tous les 10 à 15 ans (maximum 20 ans) qui prélève au maximum 30 % du volume, ou tous les 8 à 10 ans qui prélève au maximum 25% du volume. Surface terrière minimale après éclaircie de 15m².
- L' extraction des arbres mûrs (diamètre à 1,30 mètre supérieur à 45cm).

Peuplement régularisé

Pente forte, rôle de protection ou paysager

Irrégularisation du peuplement en pratiquant l'ouverture de trouées ou parquets de régénération (surface inférieure à 0,5 hectare).

Pas de contraintes particulières

Sylviculture intensive en futaie régulière :

- Dépressage précoce et dégagement
- Éclaircies d'amélioration
- Coupe de régénération

- Souvent localisé à une altitude inférieure à 1300 mètres (Étage montagnard inférieur)
- Plus fréquent en adret
- Substrats assurant un enracinement superficiel

n°272112
FUTAIE SUR STATIONS LIMITES
Fortes contraintes hydriques
Classes de fertilité III et IV
Hauteur dominante inférieure à 18 mètres à 60 ans

Favoriser les autres essences plus adaptées à la station

- Dégagement au profit des essences plus adaptées
- Coupe d'extraction